

# Pamuk Çözümlerimiz

**Coragen<sup>®</sup> 20 SC**  
İnsektisit

**Avaunt<sup>®</sup> 150 EC**  
İnsektisit

# Coragen® 20 SC

İnsektisit

## Etken maddesi:

200 g/l Chlorantraniliprole  
Suspansiyon Konsantre (SC)

## Formülasyonu:

**Coragen® 20 SC** pamukta sorun olan **Yeşilkurt, Dikenlikurt ve Pamuk yaprakkurdu** (*Prodenya*) zararlılarına karşı kullanılan, yeni bir etki mekanizmasına sahip, üstün özellikleri olan bir insektisittir.

## Özellikleri:

- **Coragen® 20 SC** yüksek biyolojik aktiviteye sahiptir.
  - Üstün formülasyonu sayesinde ilacın uygulamaya hazırlanması ve ilaçlama aletinin temizlenmesi çok kolaydır.
  - Düşük dozlarda etkin koruma sağlar.
  - Yaprak içinde taşınır (translaminar etki).
  - **Coragen® 20 SC** pamukta **Yeşilkurt ve Pamuk yaprakkurdu** (*Prodenya*) zararlıları ile mücadelede bu zararlıların herhangi bir dölüne karşı kullanılabilir.
  - **Coragen® 20 SC** ile en iyi etki için yumurtaların açıldığı dönemde ilaçlama yapılması uygundur.
  - Zararlının dönem içerisindeki yoğunluğuna bağlı olarak gerekirse 10-14 gün arayla ilaçlama tekrarlanmalıdır.
- \*Pamukta sezon içinde aynı yerde 2'den fazla Coragen® 20 SC uygulaması yapmayınız.**

## Uygulama Zamanı:



## Yeşilkurt - Pamuk Kozasındaki Zararı (*Helicoverpa armigera*)

## KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

Bitki Adı	Zararlı Adı	Kullanım Dozu	Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Pamuk	Yeşilkurt ( <i>Helicoverpa armigera</i> )	17,5 ml / da	21 gün
	Pamuk yaprakkurdu ( <i>Spodoptera littoralis</i> )		
	Dikenlikurt ( <i>Earias insulana</i> )	20 ml / da	
Elma Armut	Armut yaprak galeri güvesi ( <i>Leucoptera scitella</i> )	17,5 ml / 100 lt su	14 gün
	Elma içkurdu ( <i>Cydia pomonella</i> )	12,5 ml / 100 lt su (yumurta)	
Ayva	Elma içkurdu ( <i>Cydia pomonella</i> )	12,5 ml / 100 lt su (yumurta)	14 gün
Şeftali Kayısı	Şeftali güvesi ( <i>Anarsia lineatella</i> )	20 ml / 100 lt su	14 gün
	Doğu meyve güvesi ( <i>Cydia molesta</i> )	17,5 ml / 100 lt su	
Erik	Şeftali güvesi ( <i>Anarsia lineatella</i> )	20 ml / 100 lt su	14 gün
Patates	Patates böceği ( <i>Leptinotarsa decemlineata</i> )	6 ml / da (larva)	14 gün
	Patates güvesi ( <i>Phthorimaea operculella</i> )	20 ml/da	14 gün
Mısır	Mısır koçankurdu ( <i>Sesamia nonagrioides</i> )	15 ml / da (15 gün ara ile 2-3 uygulama)	14 gün
	Mısırkurdu ( <i>Ostrinia nubilalis</i> )		
	Bozkurt ( <i>Agrotis ipsilon</i> , <i>Agrotis segetum</i> )		
Mısır (Damla sulama ile)	Mısır koçankurdu ( <i>Sesamia nonagrioides</i> ) Mısırkurdu ( <i>Ostrinia nubilalis</i> )	35 ml / da (15 gün ara ile 2 uygulama)	21 gün
Bağ	Salkım güvesi ( <i>Lobesia botrana</i> )	15 ml / 100 lt (yumurta)	3 gün (sofralık) 28 gün (şaraplık) 7 gün (asma yaprağı)

# Avaunt® 150 EC

İnsektisit

**Etken maddesi:**  
**Formülasyonu:**

Litrede 150 gr. İndoxacarb  
Emülsiyon Konsantre (EC)

**Avaunt® 150 EC** pamukta sorun olan **Yeşilkurt ve Pamuk yaprakkurdu** (*Prodenya*) zararlılarına karşı kullanılan, mide ve değme etkili bir insektisittir.

**Özellikleri:**

- Larvaların bütün dönemlerinde etkilidir.
- İlaçlamadan 2-8 saat sonra larvaların beslenmesi durur.
- Larvalar hareket edemez hale gelir, paralize olur. (Bazıları toprağa düşer)
- Yararlı böceklere seçiciliği yüksektir.

**Uygulama Zamanı:**

- **Avaunt® 150 EC** pamukta Yeşilkurt ve Pamuk yaprak kurdu (**Prodenya**) zararlıları ile mücadelede bu zararlıların herhangi bir dölüne karşı kullanılabilir.
- **Avaunt® 150 EC** ile en iyi etki için yumurtaların açıldığı dönemde ilaçlama yapılması uygundur.
- Zararlının dönem içerisindeki yoğunluğuna bağlı olarak gerekirse 10-14 gün arayla ilaçlama tekrarlanmalıdır.



**Yeşilkurt - Pamuk Kozasındaki Zararı**  
(*Helicoverpa armigera*)



**Pamuk Yaprakkurdu - Prodenya**  
(*Spodoptera littoralis*)

## KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

Bitki Adı	Zararlı Adı	Kullanım Dozu	Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Pamuk	Yeşilkurt ( <i>Helicoverpa armigera</i> )	45 ml / da (larva)	14 gün
	Yaprakkurdu ( <i>Spodoptera littoralis</i> )	40 ml / da (larva)	
Fındık	Fındıkkurdu ( <i>Curculio nucum</i> )	45 ml / 100 lt su	14 gün
Elma	Elma içkurdu ( <i>Cydia pomonella</i> )	35 ml / 100 lt su (larva)	7 gün
Bağ	Salkım Güvesi ( <i>Lobesia botrana</i> )	25 ml / 100 lt su (larva)	3 gün (sofralık) 10 gün (şaraplık) 3 gün (asma yaprağı)
Domates (sera)	Yeşilkurt ( <i>Helicoverpa armigera</i> )	40 ml / 100 lt su	3 gün
Biber (sera)	Pamuk yaprakkurdu ( <i>Spodoptera littoralis</i> )	35 ml / 100 lt su	3 gün

## İletişim

### Batı Bölge | Ege - Marmara

Bölge Müdürü İlker Damar

0532 286 08 91

Satış ve Teknik Sorumlusu Oğulcan Topcuoğlu

0542 781 98 05

Satış ve Teknik Sorumlusu Atalay Türel

0544 470 22 71

### Orta Bölge | Karadeniz - İç Anadolu - Antalya Bölge

Bölge Müdürü Uğur Dolu

0541 288 04 12

Satış ve Teknik Sorumlusu Göktürk Altuntaş

0530 974 02 69

Satış ve Teknik Sorumlusu Tuncay Geyik

0530 974 02 59

Satış ve Teknik Sorumlusu Muhammet Evbezi

0530 974 02 79

### Doğu Bölge | Çukurova Bölge - GAP Bölge

Bölge Müdürü Duran Sarı

0549 785 16 47

Satış ve Teknik Sorumlusu Musa Aydın

0541 287 99 78

Satış ve Teknik Sorumlusu Ufuk Doğan

0549 778 94 44

Satış ve Teknik Sorumlusu Ali Barış Akoğlu

0549 785 16 43

