

İmal tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat tarihi ve numarası:

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Kontrol Edilen Yabancı Otlar	Uygulama Dozu	Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre (gün)
BUĞDAY	Adı Yavşan otu (<i>Veronica hederifolia</i>) Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Ballıbaba (<i>Lamium amplexicaule</i>) Yabani menekşe (<i>Viola arvensis</i>) Kokar ot (<i>Bifora radians</i>) Serçe dili (<i>Stellaria media</i>) Ebe gümeçi (<i>Malva neglecta</i>) Yapışkan otu (<i>Galium aparine</i>) Kırmızı çiçekli ballıbaba (<i>Lamium purpureum</i> L.) Çobançantası (<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Kanarya otu [<i>Senecio vulgaris</i> L.], Gelincik [<i>Papaver rhoeas</i> L.] ve Tarla menekşesi [<i>Viola arvensis</i> Murray]	12.5 g/da	-

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Viento önce ayrı bir kapta bit miktarı su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

FMC VIENTO®

Süspansiyon konsantré (SC)

Grup	B : F1	Herbisit (Yabancıot İlacı)

500 g/L Diflufenican + 50 g/L Florasulam

-Önce etiketi okuyunuz
-Evde kullanmayınız,
-Çocuklardan gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz,
-Bitki koruma ürününün buhar ve/veya zerrecelerini solumayınız.
-Bitki koruma ürününün uygulanması esnasında hiçbirşey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
-Bu bitki koruma ürününün uygulandığı sahaya insan ve hayvanların tekrar girişi ile ilgili bir kısıtlama bulunmamaktadır. İlaç kuruduktan hemen sonra uygulama yapılan alana girilebilir.
-İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edilen şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının ¼'ün kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Etkilenen kişiyi tehlike alanından uzaklaştırın. Kaza veya rahatsızlık olması durumunda derhal tıbbi yardım alın (mümkünse kullanım talimatlarını veya güvenlik bilgi formunu gösterin).

Yutulması halinde: Kazara yutulursa, ağzınızı suyla çalkalayın (sadece kişinin bilinci açık ise). Kusturmaya ÇALIŞMAYIN. Derhal tıbbi yardım alın.

Gözle teması halinde: Gözlerle temasında derhal bol su veya göz solüsyonları ile göz kapaklarını ayırarak yıkayın. Kontak lens varsa çıkarın. Tahriş devam ederse göz doktoruna danışın.

Deriyle teması durumunda: Cilt ile temasından sonra hemen bol su ve sabun ile yıkayınız. Kirlenmiş giysileri çıkarınız ve tekrar kullanmadan önce yıkayınız. Cilt tahrişi durumunda, bir doktora danışın.

Solunması halinde: Kazazedeyi temiz havaya çıkarın, sıcak tutun ve dinlendirin. Gözetim altında tutun. Semptomlar gelişirse derhal tıbbi yardım alın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Semptomik tedavi uygulanır.

Herhangi bir zehirlenme anında aşağıdaki Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) telefon numarasını arayarak ilk yardım ve tedavi için daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Ulusal Zehir Merkezi (UZEM) Tel: 114

© FMC'nin tescilli markasıdır.

Net Miktarı:
Azami Perakende Satış Fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Diflufenican, Florasulam
ZARARLILIK İŞARETİ:



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P391 Döküntüleri toplayın.
P501 İçindekileri/konteynerleri yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası yönetmeliklere uygun şekilde onaylanmış tesislerde bertaraf edin.
EUH208 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanında kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına bulaştırmayınız.
- Bitki koruma ürünü atıklarını akarsu, göl, havuz sularına ve çeşme yalıklarına bulaştırmayınız.
- Rüzgarlı havada uygulama yapmayınız.
- Bitki koruma ürünü mahallün tamamını tarlaya püskürtünüz.
- Dökülmesi halinde üzerine kum, toprak vs. gibi emici maddelerden serpin sonra süpürüp toplayın ve imha edin.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FMC

FMC TURKEY ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN. LTD. ŞTİ.
Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3
Nidakule Ataşehir Kuzey Kat:15/149
Ataşehir / İST. YENİKAPI V.D. 3880829460
MERSİS No: 0388082946000001

Dr. Murat KAHYAOĞLU
Teknik Müdür

Dz. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı V.

17 Kasım 2020

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

[Handwritten signature]

35 N

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Buğday:

Çıkış sonrası uygulama genellikle yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu dönemde yapılmalıdır. Bununla birlikte buğdayda kardeşlenme döneminin sonuna kadar ilaçlama tamamlanmalıdır. Kullanılan su miktarı 20-30 L/da olmalıdır. İlaçlamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

Tarlanın bozulması durumunda:

Baharda Viento® uygulanmış tarlanın bozulması durumunda; aynı tarlaya sadece buğday, arpa, yulaf, mısır ve çavdar ekilebilir.

Münavebe:

Viento uygulanmış ürün hasadı yapıldıktan sonra aynı yıl içerisinde araziye hububat, kolza, fasulye ve lahanagiller ekilebilir.

Viento uygulanmış ürün hasadından sonra aynı takvim yılı içerisinde aynı tarlaya hububat, kolza, fasulye, şeker pancarı, patates, mısır, havuç ve lahanagiller ekilebilir.

Hedef olmayan bitkilere bulaşmasına ve rüzgarla sürüklenerek bulaşmalara engel olunuz.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Viento® (Diflufenican + Florasulam) adlı bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre grubu B : F1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Viento®'nun aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (B: F1 grubu harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

Kısıtlamalar:

Stress altındaki bitkilere uygulamayınız. Viento® uygulaması yapılmış buğday tarlasında hayvan otlatılmamalıdır.

Daha fazla bilgi için lütfen satıcı firmaya ya da FMC firmasına başvurunuz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Karışım yapılması durumunda diğer ilaçların etiket bilgileri dikkate alınmalı, ön karışım testi yapılmalıdır.

Karışımı hazırlarken tankın karıştırıcısı açık tutulmalıdır. Karışım yapılacak ilaçların sıralaması şu şekilde olmalıdır; su, dağılılabılır granüller, ıslanabilir tozlar, süspansiyon konsantreler. Her bir ürün yarısı suyla doldurulmuş tanka ayrı ayrı konmalıdır. Hazırlanan karışım bekletilmeden uygulanmalıdır.

FMC

VIENTO®

Akıcı konsantre (SC)

Grup	B : F1	Herbisit (Yabancıot İlacı)

500 g/L Diflufenican + 50 g/L Florasulam

FİRMA BEYANI :

FMC bu ilacın etiketteki kimyevi maddeye uygunluğunu ve normal kullanma şartlarında, tavsiyelere göre kullanıldığında, etikette yer almış kullanma gagesine uyacağını garanti eder. Bu ilacın kullanımından meydana gelebilecek tüm zararları ortadan kaldırmak mümkün değildir. Mahsul zararları, tesirsizlik ve diğer istenmeyen sonuçlar, hava şartlarından, kimyevi maddelerin bulunmasından veya arzu edilmeyen ilaçlamalardan meydana gelebilir ki bunlar FMC'nin kontrolü dışındadır. Bu ilaçla tavsiyelere uygun olmayan şekilde ve normal ilaçlama koşulları dışındaki şartlarda yapılan ilaçlamalar neticesinde meydana gelebilecek zararlardan FMC hiçbir surette mesul değildir. Tüm riskler alıcı tarafından kabul edilecektir. FMC BU İLACIN YUKARIDA BELİRTİLEN GAYELER DIŞINDA NE ÖZEL BİR AMAÇ İÇİN NE DE DİĞER BAŞKA GAYELER İÇİN KULLANILMASINDAN MEYDANA GELEBİLECEK SONUÇLAR İÇİN GARANTİ VEREMEZ.

Ruhsat Sahibi:

FMC Turkey Endüstri Ürünleri San. Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3
Nidakule Ataşehir Kuzey Kat:15 Ofis No:149
Ataşehir/İstanbul
Tel: 0 216 900 24 81
Faks: 0 216 900 24 82
Acil durum tel. (Chemtrec) : 0 212 705 53 40

Üretici Firma:


Cheminova A/S
Thyboronvej 78 DK-7673
Harboore - Danimarka

Üretim Tesisi (Fabrika):

LABORATORIOS SIRGA, S.A.,
Carrer Jaume I, 7, 45560 Massalfassar,
Valencia İspanya

17 Kasım 2020

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



FMC

FMC TURKEY ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN. LTD. ŞTİ.
Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3
Nidakule Ataşehir Kuzey Kat:15/149
Ataşehir / İST. YENİKAPI V.D. 3880829460
MERSİS No: 0388082946000001

Dr. Murat KAHYAOĞLU
Teknik Müdür