

İmal tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şaşı No:
Ruhsat tarih ve numarası: 10.10.2008 ve 6563

Kullanılacağı Bitki ve Zararlı Organizmalar:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Domates (tarla ve sera)	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	12 g'da (larva) - Tarla 12 g/100 L su (larva) - Sera	1 gün
Biber (tarla ve sera)	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	12 g'da (larva) - Tarla 12 g/100 L su (larva) - Sera	1 gün
Domates (sera)	Pamuk yaprakkurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	12 g/100 L su (larva)	1 gün
Domates (sera)	Domates güvesi (<i>Tuta absoluta</i>)	10 g/100 L su (larva)	1 gün
Biber (sera)	Pamuk yaprakkurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	12 g/100 L su (larva)	1 gün
Hiyar (tarla ve sera)	Pamuk yaprakkurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	12 g'da (larva) - Tarla 12 g/100 L su (larva) - Sera	1 gün
Patlıcan (sera)	Pamuk yaprakkurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	12 g/100 L su (larva)	1 gün
Patlıcan (tarla)	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	12 g'da (larva)	1 gün
Lahana	Lahana Yaprakgüvesi (<i>Plutella xylostella</i>)	12 g'da (larva)	1 gün
Kamabahar (tarla)	Lahana Yaprakgüvesi (<i>Plutella xylostella</i>)	12 g'da (larva)	1 gün
Pamuk	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	12 g'da (larva)	21 gün

FMC Altacor® 35 WG

Suda Dağılabilen Granül (WG)

Grup	28	Insektisit (Böcek ilacı)
------	----	--------------------------

%35 Chlorantranilprole

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ
EVDE KULLANMAYINIZ
ÇOCUKLARDAN GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ,
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VEYA ZERRELERİNİ
SOLUMLAYINIZ.
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DUVENİ VE GÖZLÜK KULLANINIZ
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI ESNASINDA HIÇBİRŞEY
YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
HAYVANLARIN VE İNSANLARIN TEKRAR GİRİŞİ İLE İLGİLİ BİR KISITLAMA
BULUNMAMAKTADIR. İLAÇ KURUDUKTAN HEMEN SONRA UYGULAMA
YAPILAN ALANA GİRİLEBİLİR.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI, ÜZERİNE RİSKİLE ÖNLEMELİK İÇİN, TAVSİYE
EDİLDİĞİ ŞEKLİDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLYARDIM ÖNLEMLERİ:

Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilkyardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalajı veya etiketini birlikte götürünüz. Bilinçsiz bir kişiye asla ağzından herhangi birşey vermeyiniz.

Yutulması halinde: Maddenin tehlikeli olması beklenmediğinden dolayı özel müdahaleler belirtilmemiştir. Ağzı suyla çalkalayınız. Gereki görüldüğü takdirde bir doktora başvurunuz.

Gözle teması halinde: Kontakt lensler varsa ve çıkarması kolaysa çıkarınız. Gözleri açık tutarak 15-20 dakika kadar yavaş ve dikkatlice suyla yıkayınız. Göz tahrişinin devamı halinde bir uzmana başvurunuz.

Deriye teması durumunda: Özel ilkyardım tedbirleri gerektirecek zararları yoktur. Deriye bulağına, suyla iyice yıkayınız. Tekrar giymeden önce giysilerinizi yıkayınız.

Solumması halinde: Özel ilkyardım tedbirleri gerektirecek zararları yoktur. Önemli miktarlarda maruz kalınrsa doktora başvurunuz.

ANİTODU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

Herhangi bir zehirlenme anında aşağıdaki Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) telefon numarasını arayarak ilk yardım ve tedavi için daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM): 114

® FMC'nin tescilli markasıdır.

26 Mart 2021

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



İNDEKİLER: Chlorantranilprole, Lignosulfonic asit, sodyum tuzu, sulfomethylated ZARARLILIK İŞARETİ:



DİKKAT ZARARLILIK İFADELERİ:

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P273 Çevreye verilmemesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet kullanın.
P391 Döküntüleri toplayın.
P501 İçerdiği/kabı onaylanmış bir atık bertaraf tesisinde bertaraf edin.
EUH401 - İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullandığınız talimatlarına uyun.

KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Anılara zehirlidir. Ürünün pipetlenme döneminde kullanılmayınız. İlaçlama bal arılarına aktif olmadığı zaman yapılmalıdır.
- Balıklarına çok zehirlidir. İlacın genel olarak ilaçlama alanı dışındaki bitkilere ve su kaynaklarına ulaşmasına engel olunuz.
- İpek böceklerine etki olduğu için, ilaçlama anında ilacın ruzağarla yakındaki dut ağaçlarına taşınmasına engel olunuz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığından 3 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FMC

FMC TÜRKİYE ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN. LTD. ŞTİ.

Barbaros Mah. Beğonya Sok. No:3

Nidkule Atışehir Kuzey Kat:15/149

Atışehir / İST. YENİKAPI V.D. 3880829460

MERSİS No: 0388082946000001

Dr. Murat KAHYAĞOĞLU
Teknik Müdür

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Domates, Biber ve Patlıcan: Yeşilkurt (*Helicoverpa armigera*): Meyveye giriş yapmadan önce ilaçlamayı başlatmak gerekir. Tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilecek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta veya larva aranır. 100 bitkiden 51 bulaşık bulunursa derhal mücadeleyle geçilir. **Altacor® 35 WG** ile en iyi etki için yumurtaların birakıldığı veya yeni açıldığı dönemde ilaçlama yapılması uygundur. İlaçlamadan 10 gün sonra tarlalar kontrol edilir, ilaçlamayı gerektirecek yoğunluk varsa ilaçlama tekrarlanır.

Domates, Biber, Hiyar ve Patlıcan: Pamuk yaprakkurdu (*Spodoptera litoralis*): Köşegenler yönünde yürüyerek yapılan kontrollerde 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Survey 10-12 gün aralıklarla tekrarlanmalıdır. Eşğin üzerinde bir zararlı popülasyonu görüldüğü halde ilaçlamalar yinelenmelidir.

Domates: Domates güvesi (*Tuta absoluta*): Yapılan kontrollerde üretim alanının büyüklüğüne göre en az 100 bitki kontrol edilir. 100 bitkiden 3 ü yumurta ve larva ile bulaşık ise mücadeleye karar verilir. İlaçlamadan 5-6 gün sonra bitkiler tekrar kontrol edilir. Gerekirse ilaçlama tekrarlanabilir.

Lahana, Karnabahar: Lahana Yaprakgüvesi (*Plutella xylostella*): Fidelerin tarlaya dikilmesinden 10 gün sonra başlamak üzere tarla 10 günde bir kontrol edilir. Tarlaya köşegenleri doğrultusunda girilip her 10 adımda bir bitki kontrol edilir. Zarar belirtilerine Mayıs-Eylül aylarında yaygın olarak rastlandığında ilaçlamaya karar verilir. Yeni çıkan yabraklarda zarar belirtileri artıyor ise ilaçlamanın tekrarlanması gerekir.

Pamuk: Yeşilkurt (*Helicoverpa armigera*): Pamukta Yeşilkurt zararlısı ile mücadelede bu zararlıların herhangi bir dölüne karşı kullanılabilir. En iyi etki için yumurtaların açıldığı dönemde ilaçlama yapılması uygundur. Zararlıların dönem içindeki yoğunluğuna bağlı olarak gerekirse 10-14 gün aralıklarla ilaçlama tekrarlanmalıdır.

Sezon içinde aynı yerde domatese, biberde, hiyarda patlıcanda, lahana, karnabarda ve pamukta 2 den fazla **Altacor® 35 WG** uygulamayı yapmayınız.

Altacor® 35 WG fide için bitki yetiştirilen yerlerde kullanılmamalıdır.

Altacor® 35 WG ilaçlamanın ardından, bitki üzerinde ilaç kurumasından 1-2 saat sonra yağın yağışlardan etkilenmez, ilaçlamayı tekrarlamaya gerek kalmaz.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Altacor® 35 WG adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 28 olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünleri tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için **Altacor® 35 WG** nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup 28 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanımına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Formülasyonlarda değişiklikler olabileceği için kullanıcılardan geniş çapta uygulama yapmadan önce istenen karışımı küçük miktarlarda test ederek gökime ve katlaşma olup olmadığını gözlemlemeleri önerilir. Farklı özelliklerde değişik materyallerin karışımları ve yoğun karışımlar tavsiye edilmez. Karışım yapılacaktır. **Altacor® 35 WG** nin ve diğer karışım yapılacak pestisitlerin etkisinde yer alan sınırlamalara ve önlemlere uyunuz. Etiket üzerinde yer alan kullanım dozunu aşmayınız. Etiketinde bu tür karışımlarla ilgili sınırlanmış olan ilaçlara karışım yapmayınız.

26 Mart 2021

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

FMC

Altacor® 35 WG

Suda Dağılılabilen Granül (WG)

Grup	İnsektisit (Böcek İlaç)
28	%35 Chlorantraniliprole

%35 Chlorantraniliprole

FİRMA BEYANI:

FMC bu ilacın etiketeki kimyevi maddeye uygunluğunu ve normal kullanıma şartlarında, tavsiyelere göre kullanıldığında, etikette yer almış kullanıma gavesine uyacağına garanti eder. Bu ilacın kullanımından meydana gelebilecek tüm zararları ortadan kaldırmak mümkün değildir. Mahsul zarar, tesisizlik ve diğer istenmeyen sonuçlar, hava şartlarından, kimyevi maddelerin bulunmasından veya arzu edilmeyen ilaçlamalardan meydana gelebilir ki bunlar FMC'nin kontrol dışındadır. Bu ilaç tavsiyelere uygun olmayan şekilde ve normal ilaçlama koşulları dışındaki şartlarda yapılan ilaçlamalar neticesinde meydana gelebilecek zararlardan FMC hiçbir şekilde mesul değildir. Tüm riskler alıcı tarafından kabul edilecektir. FMC BU İLACIN YUKARIDA BELİRTİLEN GAYELER DİŞİNDE, NE ÖZEL BİR AMAÇ İÇİN NE DE DİĞER BAŞKA GAYELER İÇİN KULLANILMASINDAN MEYDANA GELEBİLECEK SONUÇLAR İÇİN GARANTİ VEREMEZ.

Ruhsat Sahibi:

FMC Turkey Endüstri Ürünleri San. Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3
Nidakule Ataşehir Kuzey Kat:15 Ofis No:149
Ataşehir/İstanbul

Tel: 0 216 900 24 81

Faks: 0 216 900 24 82

Acil durum tel. (Chemtree): 0 212 705 53 40

Üretim Tesisi:

Gowan Milling Company LLC
12300 East County 8th St
Yuma, Arizona 85365
ABD

Üretici Firma:

FMC Corporation
2929 Walnut Street, Philadelphia
Pennsylvania 19104 ABD

FMC
FMC TÜRKİYE ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN. LTD. ŞTİ.
Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3
Nidakule ATAŞEHİR KÜZEY KAT:15/149
ATAŞEHİR / İST. YENİKAPI V.D. 3880829460
MERSİS No: 0388082946000001

Dr.Murat KAHYAOĞLU
Teknik Müdür



® FMC'nin tescilli markasıdır.