

FMC

An Agricultural
Sciences Company

Fındık Kurduna Karşı Etkili Kullanıcıya Dost Çözüm

Avaunt® 150 EC
İnsektisit





An Agricultural
Sciences Company

Avaunt® 150 EC

İnsektisit


Aktif maddesi: Litrede 150 gr. Indoxacarb
Formülasyonu: Emülsiyon Konsantre (EC)

Avaunt® 150 EC fındıkta mücadele yapılmadığı takdirde ciddi verim ve kalite kayıpları meydana getiren, fındık kurdu zararlısına karşı kullanılan bir insektisittir.

Özellikleri:

- Mide ve temas yolu ile zararlıyı kontrol eder.
- Larvaların tüm dönemlerinde etkilidir.
- İlaçlamadan sonra hızlı bir şekilde beslenmeyi durdurur.
- Faydalı böceklere karşı seçiciliği yüksektir.
- Kullanıcı açısından güvenlidir. Uygun olarak kullanıldığında, herhangi bir şekilde ciltte tahriş meydana getirmez.
- Entegre Zararlı Yönetimi programlarından kullanılabilir.
- Farklı sıcaklık koşullarında yüksek etki gösterir.
- Yağmurdan yıkanmaya karşı dayanıklıdır.

Avaunt® 150 EC'nin Etki Mekanizması:



Indoxacarb, sodyum girişini engelleyerek, sinir hücrelerinde depolarizasyonu durdurmaktadır. Indoxacarb'ın diğer gruptaki ilaçlardan farklı bir etki şekli vardır. Böceklerin sinir sistemindeki sodyum kanallarını tıkayarak etki eder. Böylece bu kanallardan sodyum girişi engellenir ve sinir hücrelerinde depolarizasyon olur. Bu sayede böcekte önce beslenme durur ve daha sonra ölüm gerçekleşir.

Avaunt® 150 EC

İnsektisit

Uygulama Zamanı: Fındık kurduna karşı meyvelerin mercimek iriliğine geldiğini dönemde yapılan kontrollerde 10 ocakta 2'den fazla fındık kurdu görülmesi durumunda uygulama yapılır.



Fındık Kurdu - Ergin
(*Curculio nucum*)



Fındık Kurdu - Larva
(*Curculio nucum*)

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

Bitki Adı	Zararlı Adı	Kullanım Dozu	Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Pamuk	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	45 ml / da (larva)	14 gün
	Yaprakkurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	40 ml / da (larva)	
Fındık	Fındıkkurdu (<i>Curculio nucum</i>)	45 ml / da (ergin)	14 gün
Elma	Elma içkurdu (<i>Cydia pomonella</i>)	35 ml / 100 lt su (larva)	7 gün
Bağ*	Bağ Salkım güvesi (<i>Lobesia botrana</i>)	25 ml / 100 lt su (larva)	3 gün (sofralık üzüm) 10 gün (şaraplık üzüm)
Domates (sera)	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	40 ml / 100 lt su	3 gün
Biber (sera)	Pamuk yaprakkurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	35 ml / 100 lt su	3 gün
Mısır	Mısır Koçankurdu (<i>Sesamia nonagrioides</i>)	30 ml/da	14 gün
	Mısırkurdu (<i>Ostrinia nubilalis</i>)		

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.



An Agricultural
Sciences Company

İletişim

Batı Bölge | Ege - Marmara

Bölge Müdürü EMRAH UÇAR 0533 382 24 28

Satış ve Teknik Sorumlusu

İzmir - Oğulcan Topcuoğlu 0542 781 98 05

İzmir - Uluhan Mert Çakmak 0533 382 24 66

Bursa - İlhan Öztürk 0533 382 24 51

Tekirdağ - Atalay Türel 0544 470 22 71

Orta Bölge | Karadeniz - İç Anadolu - Antalya

Bölge Müdürü MUSTAFA ONUR HANEDAR 0532 745 50 93

Satış ve Teknik Sorumlusu

Ankara / Karadeniz - Göktürk Altuntaş 0530 974 02 69

Antalya - Tuncay Geyik 0530 974 02 59

Antalya - Muhammet Evbezi 0530 974 02 79

Konya - Mehmet Çetin 0533 383 43 44

Doğu Bölge | Çukurova - GAP

Bölge Müdürü Ali Barış Akoğlu 0549 785 16 43

Satış ve Teknik Sorumlusu

Adana - Musa Aydın 0541 287 99 78

Adana - Ufuk Doğan 0549 778 94 44

Şanlıurfa - Yunus Bayram 0534 832 69 59

Diyarbakır - Yusuf Alar 0533 382 24 75



Bitki koruma ürünlerini güvenli bir şekilde kullanınız.
Kullanmadan önce etiketi ve ürün bilgisini dikkatlice okuyunuz.
Yazılara uyunuz. Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması yasaktır.
UZEM (Ulusal Zehir Merkezi) Tel: 114
Herhangi bir zehirlenme veya diğer acil durumlarda aşağıdaki
Chemtrec numarasını arayarak yardım alabilirsiniz.
CHEMTREC: 0212 705 53 40 (24 Saat)

www.fmcturkey.com.tr

[f /fmcturkey](https://www.facebook.com/fmcturkey) [/fmcturkey](https://www.instagram.com/fmcturkey) [FMC Turkey](https://www.youtube.com/channel/UCFMC_Turkey)